

Typ zobrazovací metody	Dostupnost vyšetření	Dostupnost výsledku	Pokyny pro pacienta
SKIAGRAFIE	Bez objednání	Rutina do 3 dnů/Statim bezprostředně po vyšetření	Bez přípravy; případné těhotenství hlase předem
SKIASKOPIE	3 týdny; objednání na tel. č.: 487 954 373	Rutina do 3 dnů/Statim bezprostředně po vyšetření	U vyšetření s podáním kontrastní látky i. v. nutná premedikace: 2 hodiny před vyšetřením 2 tbl Dithiadenu. Alergický pacient navíc Prednison 20 mg - 13, 7 a 1 hodinu před vyšetřením (zajistí indikující lékař); případné těhotenství hlase předem
Vyšetření jícnu			Nalačno
Vyšetření žaludku			Nalačno
Pasáž			Nalačno
Irrigografie (vyšetření střev)			Nalačno, vyprázdněná střeva
Skiaskopie plic			Bez přípravy
Skiaskopie skeletu			Bez přípravy
Fistulografie			Bez přípravy
Cystografie			Bez přípravy
Retrográdní uretrografie			Bez přípravy
Mikční cystouretrografie			Bez přípravy
Ascendentní pyelografie, Perkutánní nefrostomie, Stent	Po domluvě s indikujícím lékařem		Dle indikujícího lékaře
ERCP	Zajišťuje pracoviště endoskopie ve spolupráci s ind. lékařem a RDG; provádí se za hospitalizace		Dle indikujícího lékaře

Typ zobrazovací metody	Dostupnost vyšetření	Dostupnost výsledku	Pokyny pro pacienta
POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE (CT)	STATIM vyšetření domlouvá vždy indikující lékař s radiologem; objednání na tel. č.: 487 954 393	Rutina do 7 dnů/Statim bezprostředně po vyšetření	Případné těhotenství hlase vždy předem
CT nativní	6 týdnů		Bez přípravy; u vyšetření břicha nutno vypít půl hodiny před příchodem na pracoviště CT k vyšetření 0,5 l vody
CT s podáním kontrastní látky	8-12 týdnů		U všech vyšetření s podáním k. l. i. v. nutná premedikace: 2 hodiny před vyšetřením 2 tbl Dithiadenu. Alergický pacient navíc Prednison 20 mg – 13; 7 a 1 hodinu před vyšetřením (zajistí indikující lékař); Vyšetření se provádí nalačno. Nutno zajistit odběry UREA, KREATININ (ne starší než týden) - zajistí indik. lékař. Pokud pacient užívá léky obsahující Metformin, je nutné je po domluvě s indik. lékařem vysadit - ostatní trvalou medikaci lze užít a zapít douškem vody.
CT břicha			Nalačno; cca 1 hodinu před vyšetřením je nutné doma vypít 0,5-0,75 l vody; premedikace; odběry
CT colono			Nalačno; vyprázdněná střeva; premedikace; odběry
CT enteroklýza (enterografie)			Nalačno; vyprázdněná střeva; premedikace; odběry
CT Angiografie			Nalačno; premedikace; odběry
Intervence pod CT - PRT, drenáž, punkce	Provádí se za hospitalizace		Premedikace; odběry vč. APTT, INR (ne starší než 3 dny); event. další příprava dle indikujícího lékaře

Typ zobrazovací metody	Dostupnost vyšetření	Dostupnost výsledku	Pokyny pro pacienta
ANGIOGRAFIE	3 týdny; objednává vždy ordinace cévního chirurga na tel. č.: 487 954 373; provádí se za hospitalizace; STATIM vyšetření domlouvá vždy indikující lékař s radiologem	Do 3 dnů	Premedikace: 2 hod. před vyšetřením 2 tbl Dithiadenu. Alergický pacient navíc Prednison 20 mg - 13; 7 a 1 hodinu před vyšetřením (zajistí indik. lékař - vč. další event. přípravy). Vyšetření se provádí nalačno. Nutno zajistit odběry: UREA, KREATININ (ne starší než týden) INR, APTT (ne starší než 3 dny). Případné těhotenství hlase předem. Užívá-li pacient léky obsahující Metformin, je nutné je po domluvě s indik. lékařem vysadit. Oholená třísla.
MAGNETICKÁ REZONANCE	8 týdnů; objednávání na tel. č.: 487 954 193		Správně vyplněná žádanka je nezbytná. Před vstupem na vyšetřovnu odložte veškeré kovové předměty a na vyšetření hlavy přicházejte nenalíčení. Před vyšetřením břicha je nutné tři hodiny lačnit. Před každým vyšetřením je nutné vyplnit informovaný souhlas vč. kovové anamnézy (z tohoto důvodu se dostavte alespoň 15 min. před výkonem).
UZ (SONOGRAFIE)	2 týdny; objednávání na tel. č.: 487 954 383	Ihned	Bez přípravy